



VARSTVO VINSKE TRTE PRED BOLEZNIMI OD POLNEGA CVETENJA DO ZAČETKA DOTIKANJA JAGOD

Nenavadne vremenske razmere v letošnji pomladi pogojujejo intenziven vegetativni razvoj vinske trte ter tudi veliko nevarnost za razvoj bolezni. Posledično je potrebno programe varstva pred boleznimi izvajati disciplinirano, s specifičnimi visokoučinkovitimi pripravki primernimi za situacije, ko je nevarnost za okužbe in razvoj bolezni velika, intervali med škropljenji morajo biti vsaj do časa, ko bodo razmere manj nevarne (višje temperature, manj vlage) kratki, cilj je, da se zagotavlja preventivna situacija!

PRIPOROČILA OD POLNEGA CVETENJA DO ZAČETKA DOTIKANJA JAGOD:

Za zanesljivo delovanje na peronosporo se lahko ob polnem cvetenju enkrat do dvakrat uporabita TWINGO ali VALIS F (VALISU F se v nevarnih razmerah doda CYMBAL, ki dodaja kurativnost!), nato se uporablja VIDERYO F, ki mu ob začetku dotikanja jagod lahko že sledi MILDICUT (obema se po potrebi dodaja CYMBAL).

Oidij vinske trte ima zelo dolgo inkubacijsko dobo, zato je potrebno opraviti škropljenja proti oidiju preventivno, še preden so prisotni vidni znaki okužb. Zdaj je primerno uporabiti DIFCOR, ki na oidij deluje tako preventivno kot tudi kurativno, sledi KUSABI v alternaciji z drugimi specifičnimi fungicidi za zatiranje oidija.

Tik pred dotikanjem jagod priporočamo uporabo botriticida ZENBY, ki ima odlično delovanje na sivo plesen, prav tako pa odlično deluje na oidij, zato, kadar se uporabi ZENBY, ni potrebno škropiti s specifičnimi fungicidi za oidij.

Certis Belchim program varstva vinske trte

TWINGO

**KURATIVNO, IZJEMNO
EKONOMIČNO**
(*cimoksanil+ folpet*)



TWINGO je fungicid, ki združuje lastnosti aktivnih snovi folpet in cimoksanil. Folpet deluje preventivno, na površini rastline ustvari zaščitno plast in jo ščiti pred novo okužbo. Cimoksanil je lokosistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem.

TWINGO se lahko uporabi že od faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12), zato predstavlja izjemno učinkovito in cenovno ugodno rešitev za najbolj zgodnji ukrep, ki ima tudi kurativno delovanje.

TWINGO se uporablja za preventivno in kurativno zatiranje peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*) v odmerku do 3 kg /ha.

Več za TWINGO



Valifenalat ima povsem specifičen način celovite in enakomerne razporeditve na površini in v notranjosti rastlin. Stimulativno deluje na genetsko osnovan mehanizem obrambnega sistema rastlin. Je edini predstavnik v svoji kemični skupini, ki se premešča sistemsko in je kurativen.

UPORABA

VALIS F je v praksi izjemno zanesljiv in učinkovit zaradi:

- **ACTIN'POWER** lastnosti valifenalata
- Folpeta kot najbolj širokega kontaktnega fungicida za vinsko trto
- Odmerek je do 2 kg/ha.
- Prvič se lahko tretira, ko se pojavi nevarnost okužbe s peronosporo, vendar ne pred razvojno fazo 5 listov (BBCH15).
- Na istem zemljišču se lahko tretira največ dva krat v eni rastni dobi.
- Folpet se najboljšje pokaže pri zgodnjih škropljenjih, zato se VALIS F priporoča na začetku vegetacije do konca cvetenja.

CYMBAL je izjemno dober partner VALISU F kadar je zaželjeno močno kurativno delovanje. Priporočena kombinacija::

- CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + VALIS F 1,5 kg/ha

Več za VALIS F



IZJEMNA MOČ DVEH
AKTIVNIH SNOVI
(ciazofamid + folpet)



Uporaba

VIDERYO F je zelo odporen za izpiranje z dežjem. Ciazofamid se sploh ne izpira z dežjem, folpet pa se v formulaciji s ciazofamidom veliko boljše oprijema listne površine kot v drugih pripravkih.

Priporočilo: naj ne bo padavin najmanj 2 uri po škropljenju.

VIDERYO F ima dobro izraženo stransko delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in sivo plesen.

VIDERYO F se po aplikaciji porazdeli enakomerno po celotnem listu, saj enakomerno difundira tudi v okolico nanešenih kapljic. S ciazofamidom in folpetom je zagotovljeno dolgo varovanje celotne mase lista, zunaj in znotraj..

VIDERYO F se uporablja kot preventivni fungicid. v pridelavi vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte v odmerku do 2,5 L/ha. Je zelo prilagodljiv glede časa uporabe saj se lahko uspešno uporablja vse od faze, ko je razvitih 5 listov do faze mehčanja jagod. Časovni interval med tretiranjmi je do 10 -12 dni in ga je potrebno prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim razmeram. V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču uporabi kar 6 krat, zato predstavlja izjemno močno orodje proti peronospori preko cele vegetacije.

Kadar je nevarnost za peronosporo velika, je VIDERYO F odličen partner CYMBAL, ki dopolnjuje odlične lastnosti VIDERYO F s kurativnostjo. V kombinaciji je priporočilo:

- VIDERYO F 2 L/ha + CYMBAL 0,25 kg/ha

[Več za VIDERYO F](#)



**Sistemično,
preventivno,
eradikativno,
antisporelno,
sporocidno**



MILDICUT je kombinacija dveh aktivnih snovi (ciazofamid in dinatrijev fosfonat), ki omogočata sistemsko, preventivno, eradikativno, antisporelno in sporocidno delovanje.

LASTNOSTI

- Dokazano odlično preventivno delovanje pred peronosporo vinske trte.
- Sistemskost in neizpirljivost zagotavljata intenzivno varovanje novega prirasta (izredno pomembna lastnost v času bujne rasti ali v deževnih razmerah, ko je nevarnost za peronosporo največja).
- Odlično zaustavljanje sporulacije – onemogoča širjenje okužbe.
- Zaradi kratke karence in močne oprijemljivosti (ne pušča madežev na jagodah) je izrazito primeren za poznejša škropljenja proti peronospori – tudi za namizne sorte.
- Za MILDICUT ni bilo ugotovljenih nobenih negativnih učinkov na kvasovke za fermentacijo vina na biokemične lastnosti vina - posledično aromatske komponente vina ostajajo nespremenjene.



UPORABA

- **Preventivna uporaba:** MILDICUT do 4 L/ha
- **Kurativa:** MILDICUT 3 L/ha + CYMBAL do 0,25 kg/ha

Več za MILDICUT



CYMBAL se lahko uporabi kadarkoli tekom vegetacije

CYMBAL v programih varstva odločilno prispeva s kurativnim delovanjem

CYMBAL deluje kurativno 2 dni in se premešča translaminarno

SINERGISTIČNI PARTNER
v vseh programih varstva proti plesnivkam



CYMBAL se vedno kombinira z drugimi fungicidi, osnovnimi pripravki programa varstva proti glivam plesnivkam. S tem se izboljša kurativnost tretmana ter poveča zanesljivost posebno v situacijah, ko je bolezen v fazi inkubacije (bolezen je prisotna brez vidnih simptomov). V takšnih situacijah pridelovalci pogosto kombinirajo drage pripravke. CYMBAL dopolnjuje osnovni fungicid z dodatnim mehanizmom delovanja in s kurativnostjo ter tako zagotavlja maksimalno zanesljivost ob zelo zmernih stroških.

VINEPRO

CYMBAL je izjemno dober partner VALISU F, VIDERYU F in MILDICUTU in dopolnjuje njihove odlične lastnosti s kurativnostjo. V kombinacijah je priporočilo:

- CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + VALIS F 1,5 kg/ha
- CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + VIDERYO F 2 L/ha
- CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + MILDICUT 3 L/ha

Več za CYMBAL

ZATIRANJE OIDIJA VINSKE TRTE



Oidij ima dolgo inkubacijsko dobo, ko je okužba že prisotna a ni vidna. Zato je izjemno pomembno, da se program varstva pred oidijem začne še preden so prisotni vidni znaki bolezni in to s pripravki, ki imajo tudi kurativno delovanje!

Če DIFCOR še niste uporabljali, od faze polnega cvetenja najprej priporočamo 2 škropljenji s triazolnim fungicidom DIFCOR. Nato uporabite KUSABI.

DIFCOR

DIFCOR vsebuje difenokonazol, ki pripada skupini triazolnih fungicidov. Je sistemik, ki se zelo enakomerno prerazporeja po rastlinskem tkivu, nima tendence hitrega kopičenja v vršičkih listov. Zato enakomerno varuje celotne volumne listov. Ima dobro kurativno delovanje.

Zatiranje oidija vinske trte (*Uncinula necator*) v odmerku 0,12 L/ha. V sezoni se lahko uporabi največ dvakrat. DIFCOR-ju se lahko dodaja tudi žveplo.

[Več za DIFCOR](#)

KUSABI

V poskusih v EU je KUSABI vedno med najbolj učinkovitimi in zanesljivimi pripravki za zatiranje oidija vinske trte. Glavne lastnosti:

- Parno delovanje, ki omogoča dobro varstvo pred oidijem tudi kadar aplikacija ni idealna.
- Translaminarno premeščanje.
- Odlično preventivno delovanje na oidij.
- Kurativno delovanje na oidij.
- Stransko delovanje na sivo plesen.

Od polnega cvetenja naprej priporočamo odmerek 0,3 L/ha. V eni sezoni se lahko uporabi 3X.

Pri vsakem škropljenju proti oidiju se specifičnemu fungicidu za oidij priporoča dodajanje 2 kg žvepla!

[Več za KUSABI](#)

ZATIRANJE SIVE PLESNI



ZENBY je učinkovit praktično na vse razvojne faze sive plesni razen na spore. ZENBY ima do 36 ur kurativnega delovanja na sivo plesen. Zaradi zanesljivosti se kljub temu priporoča izključno preventivna uporaba, kakor je to primer tudi z drugimi botriticidi. ZENBY ima zelo dolgo preventivno delovanje (na trti do 4 tedne). ZENBY se premešča translaminarno.

Za razliko od drugih SDHI botriticidov mu molekulska struktura omogoča dobro delovanje tudi na soje sive plesni odporne na druge SDHI fungicide.

UPORABA

ZENBY uporabite enkrat v sezoni (izjemoma 2 krat, kadar je potrebno škropljenje proti sivi plesni najmanj 3 krat v sezoni). ZENBY se lahko uporabi vse od cvetenja pa do pred trgatve, odvisno od karence.

Pri škropljenju celotnega habitusa trte je odmerek 1,5 L/ha, pri škropljenju v cono grozdja pa je odmerek lahko 0,8-1 L/ha.

Navedeni odmerki odlično zatirajo tudi oidij vinske trte. Zato kadar se škropi z ZENBY-jem ni potrebno uporabljati specifičnih fungicidov proti oidiju, smiselen je le dodatek žvepla.

[Več za ZENBY](#)

Dodajte

HI-WETT



Vsem priporočenim fungicidom dodajte HI-WETT, ki omogoča odlično omočevanje, zadrževanje škropilne brozge na listu ter zmanjšuje drift. Posledično je učinkovitost, ne glede na vremenske pogoje, povečana in bolj zanesljiva. Lahko se uporabijo manjše količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

ODMERKI:

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

[Več za HI-WETT](#)



BORACTIV

Celovit proizvod za oskrbo rastlin z borom, molibdenom in magnezijem.

Takoj uporabite BORACTIV (1-2 krat pred cvetenjem in/ali med cvetenjem in 1 krat po cvetenju).

- Edinstven proizvod na trgu, ki omogoča istočasno oskrbo s koncentriranimi borom, molibdenom in magnezijem v stabilni in topni obliki.
- S stimulacijo rasti in cvetenja BORACTIV zagotavlja povečanje pridelka.
- Rastline hranila v BORACTIV-u sprejemajo veliko bolje kot iz tal (razlika je še posebno velika na karbonatnih in/ali lahkih tleh).
- OBLIKA: raztopina, enostavno rokovanje.
- PRILAGODLJIVOST IN EKONOMIČNOST: kompatibilen s FFS: vse v enem prehodu, prihranek v času.
- Dovoljena uporaba v organski proizvodnji.
- ODMEREK: 2,5 L/ha po aplikaciji

Vaš Belchim

Belchim Crop Protection SI je zdaj del japonskega podjetja CERTIS BELCHIM

[Spletna stran Certis Belchim Slovenija](#)

Kontakti:

Mag. Anton Gošnik
Vodja BCP SI in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@certisbelchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@certisbelchim.com

Mitja Törnär
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@certisbelchim.com

Urban Simončič
Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
urban.simoncic@certisbelchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
vasja.hafner@certisbelchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2023 Vse pravice zadržane.