

Varstvo oljne ogrščice

Fungicidi, regulatorji rasti



Bolezni, reguliranje rasti v oljni ogrščici

BOUNTY

**Protendo
SIRENA**

Zaftra
AZT 250 SC

ZENBY

Reguliranje rasti, bolezni

**BOUNTY
SIRENA**

Reguliranje rasti, bolezni

**BOUNTY
SIRENA**

BBCH 00-09 10 11-13 14-18 30 33 50 60 65 70 80-90

**ZAFTRA AZT 250 SC
PROTENDO, ZENBY**

Bolezni


BELCHIM
CROP PROTECTION

Jesensko reguliranje rasti v oljni **ogrščici**

Zelo bujen posevek.
Naj se tretira?



Slabo razvit posevek, **suša**,
Naj se tretira?



Jesensko reguliranje rasti v oljni **ogrščici**

- Cilj je, da je oljna ogrščica za prezimitev nizka in čvrsta, saj tako laže prezimi in se spomladi bolje razvija.
- Čas uporabe: 4-6 listov oljne ogrščice.
- Odmerki:

Redek sklop
Malo dušika v tleh
Manj razvite rastline
Sorta odporna na prezimitev

Gost sklop
Založenost z dušikom dobra
Dobro razvite rastline
Sorta manj odporna na

BOUNTY[®]

ali

SIREŃA

0,4 L/ha

1,0 L/ha

0,5 L/ha

1,2 L/ha

Reguliranje rasti v oljni **ogrščici** spomladi



Preprečevanje poleganja!



Reguliranje rasti v oljni **ogrščici** spomladi

- Čas škropljenja: od začetka nastavkov popja do odpiranja cvetov (BBCH 50-60) - v tem času se zatira tudi repičar.
- Spomladi BOUNTY in SIRENA že sama dobro zatirata prisotne bolezni. V kombinaciji s fungicidi ZAFTRA, PROTENDO ali ZENBY se spekter delovanja in učinkovitosti optimizirata. Odmerki za BOUNTY in SIRENO naj se v kombinacijah prilagajajo tudi stanju posevka oz. potrebni intenzivnosti za reguliranje rasti
- Odmerki prilagojeni bujnosti:

Redek sklop
Rastline so nizke
Sorta odporna na poganjanje

Gost sklop
Rastline so visoke
Sorta **občutljiva** za poganjanje

BOUNTY

0,3-0,4 l/ha

0,5-0,6 l/ha

ali

SIRENA

1 l/ha

1,2 l/ha

Zatiranje bolezni v oljni **ogrščici**

- Jeseni uporaba fungicidov, ki imajo tudi vpliv na uravnavanje bujnosti (Bounty, Sirena) povsem zadošča tudi za varstvo pred boleznimi jeseni
- V oljni ogrščici je najbolj nevarna bolezen bela gniloba (*Sclerotinia sclerotiorum*)
 - Oljno ogrščico ogroža še cel niz bolezni kot so *Pseudocercospora capsellae*, *Pyrenopeziza brassicae*, *Alternaria brassicae*, *Phoma*, *Cylindrosporium*, *Botrytis*
- Uporaba primernih kombinacij je še kako ekonomsko upravičena, saj obvladovanje celotnega kompleksa bolezni in uravnavanja rasti izjemno pozitivno vpliva na pridelek.

Zatiranje bolezni v oljni ogrščici

Sclerotinia sclerotiorum



Zatiranje bolezni v oljni **ogrščici** Program "ECO"

- Manj intenzivna do srednje intenzivna pridelava
- Pogoji neugodni za razvoj bolezni

Čas uporabe:
Ob **začetku** cvetenja (BBCH 59-61)

BOUNTY[®]

0,5 l/ha

ali

SIREŃA

1,2 l/ha

Zatiranje bolezni v oljni **ogrščici**

Program "PREMIUM" – dvakratna aplikacija

- Visoko intenzivna pridelava, visok pridelek
- Pogoji ugodni za razvoj bolezni

Čas uporabe:

1. **škropljenje**: od začetka razvoja cvetnih brstov do prvih odprtih cvetov (BBCH 50-60)
2. **škropljenje**: od začetka cvetenja do konca cvetenja (BBCH 60-69)

1. škropljenje:

BOUNTY 0,5 L/ha ali **SIREŃA** 1,2 L/ha

2. škropljenje:

Zaftra 0,5 L/ha + **Protendo** 0,35 L/ha ali **Zaftra** 0,5 L/ha + **ZENBY** 0,3 L/ha