


TWINGO

40 g/kg cimoksanil + 334 g/kg folpet




TWINGO

- Vsebuje: 40 g/kg cimoksanil + 334 g/kg folpet
- Formulacija: močljiva zrnca (WG)
- Kultura: vinska trta
- Diseases: peronospora vinske trte
- Odmerki: do 3 Kg/Ha



folpet




cimoksanil


TWINGO Mehanizem delovanja

2 aktivni snovi z **različnim** mehanizmom delovanja
→ zanemarljiva nevarnost za pojav odpornosti

Kemična skupina folpeta
M04 : ftalimidi



Kemična skupina cimoksanila
27 : cianoacetamid-oksime




Prilagodljiva uporaba

TWINGO

40 g/kg cimoksanil + 334 g/kg folpet



Preventivno delovanje




TWINGO

cimoksanil in folpet

zdrav list

Preventivno delovanje



TWINGO

cimoksanil in folpet

zoospore okužijo
spodnji del lista


Folpet

delovanje

Cymoxanil

delovanje

Kurativno delovanje



TWINGO

cimoksanil in folpet

**penetracija micelija
preko stom**


Folpet

delovanje

Cymoxanil

delovanje

Eradikativno delovanje




TWINGO

cymoxanil and folpet

**penetracija micelija
preko stom**

Cymoxanil
delovanje

Eradikativno delovanje




TWINGO

Cimoksanil in folpet

fruktifikacija glive

Cymoxanil
delovanje

Eradikativno in preventivno delovanje



TWINGO

Cimoksanil in folpet

Veter, dež
→ nova inokulacija


Folpet

delovanje

Cymoxanil

delovanje

Prilagodljiva uporaba



TWINGO


- Preventivno : zavira klitje spor
- Kurativno : zavira razvoj micelija
 - 2 dni po okužbi
 - 24 ur po okužbi v zahtevnih pogojih
- Eradikativno : **zmanjšuje** klitje in ovira formiranje konidijev

Cimoksanil ima **kurativno** delovanje 24-48 ur po okužbi



Kurativnost 1 dan po okužbi

Peronospora vinske trte – Intenzivnost okužb na listju
Kurativno 1 dan- 13/06/14




→ Učinkovitost Twinga na listju je primerljiva učinkovitosti 120 g cimoksanila




Kurativnost 1 dan po okužbi

Peronospora vinske trte – Intenzivnost okužb na listju
Kurativno 1 dan- 13/06/14



→ Na grozdih je kurativno delovanje Twinga boljše kot samega cimoksanila!

TWINGO Prilagodljiva uporaba



Vinsko tro se lahko tretira od faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12) do faze, ko se nadaljuje obarvanje jagod (BBCH 83).

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:

- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

HI-WETT